



HYPOGLYCEMIE INSULINIQUE

A JEUN AU REPOS

BUT : Stimulation GH et Cortisol.

Déroulement de l'épreuve :

T - 30 mn	}		
T - 15 mn			
		Glycémie	(1 gris)
		Cortisol	(1 vert gel)
		ACTH	(1 violet à +4°C)
		Glycémie capillaire (noter dans le dossier)	
T 0		GH	(1 jaune)

Puis injection d'**INSULINE** rapide : HUMALOG rapide
0,10 unités / kg en IVD
0,15 unités / kg si obèse

T + 20 mn	}		
T + 40 mn			
T + 60 mn			
		Glycémie	(1 gris)
		Cortisol	(1 vert gel)
		ACTH	(1 violet à +4°C)
		Glycémie capillaire (noter dans le dossier)	
		GH	(1 jaune)
T + 90 mn			
T + 120 mn			
T + 180 mn			

(Les deux premières bases sont facultatives, voir avec le médecin).

Incidents à craindre : malaise, coma hypo.

Prévoir une seringue de sérum glucosé Hyper (**Ne jamais injecter sans l'avis du médecin**), jamais de Glucagon. Noter la quantité d'Insuline injectée sur les bons et l'heure d'apparition du malaise.

Descendre rapidement les tubes au laboratoire
ou
garder à +4°C