



TEST COUPLE AU TRH & LH RH

But du test : exploration des axes thyroïdote, lactotrope et gonadotrope.

Conditions Initiales du patient :

Au repos depuis 30 mn

Arrêter 24 h avant : Anxiolytiques, antidépresseurs, médicaments de la motricité digestive.

En phase folliculaire

Produit administré :

1 ampoule de **RELEFACT** (0,10 mg de LHRH) en pharmacie hospitalière

1 ampoule se **TRH** Ferring (200 µg dans 1 mL)

Déroulement de l'épreuve :

Au repos pendant le test

Garder les **tubes au réfrigérateur** jusqu'à la fin de l'épreuve

T -30 mn	:	Prolactine (1 tube vert gel)	
T -15 mn	:	Prolactine (1 tube vert gel)	
T 0	:	TSH, prolactine, FSH et LH (1 tube vert gel)	
		puis injection IV lente de 1 ampoule de RELEFACT	
		puis injection IV lente de 1 ampoule de TRH Ferring	
T + 15 mn	:	TSH, prolactine, FSH et LH	(1 tube vert gel)
T + 30 mn	:	TSH, prolactine, FSH et LH	(1 tube vert gel)
T + 60 mn	:	TSH, prolactine, FSH et LH	(1 tube vert gel)
Eventuellement (si précisé sur l'ordonnance)			
T + 90 mn	:	TSH, prolactine, FSH et LH	(1 tube vert gel)
T + 120 mn	:	TSH, prolactine, FSH et LH	(1 tube vert gel)

Précisez si dosages complémentaires