TEST AU CRF

A JEUN et AU REPOS

Prévoir une ampoule de Stimu ACTH 48 h à l'avance
(commander 3 jours avant au minimum)

A **8 h du matin** (ou à 8h le soir en fonction des prescriptions du médecin).

Peser le patient avant la commande

Déroulement de l'épreuve

T- 15 mn	ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 vert gel)
T0	ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 vert gel)

Puis administrer **1 µg / kg** de poids en IVD sous la forme d'un **bolus de CRF**
(solvant = sérum physiologique, ampoule de 100 µg / mL de **Stimu ACTH**
à commander une semaine à l'avance le produit à la pharmacie)

T + 5 mn	ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 vert gel)
T + 15 mn	ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 vert gel)
T + 30 mn	ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 vert gel)
T + 60 mn	ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 vert gel)
T + 90 mn	ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 vert gel)
T + 120 mn	ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 vert gel)
T + 150 mn	ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 vert gel)
T + 180 mn	ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 vert gel)

DESCENDRE RAPIDEMENT LES TUBES AU LABORATOIRE
A DEFAUT : GARDER AU REFRIGERATEUR