



TEST DE FREINAGE FAIBLE AU DEXAMETHAZONE

A JEUN et AU REPOS depuis 0 h

BUT : Suspicion de Cushing

Jour 1 : Poser flacon Ur
A **8 h** Cortisol (base) (1 vert gel)
Composé S (base) (1 jaune)

On donnera le **DECTANCYL** pendant **2 jours** de suite, aux mêmes doses et aux mêmes heures.

Jour 2 : Relever flacon Ur : CLU (Cortisol Libre Urinaire)
Reposer un autre flacon
A **8h** Donner 1 comprimé de 0,5 mg de DECTANCYL
A **14 h** Donner 1 comprimé de 0,5 mg de DECTANCYL
A **20 h** Donner 1 comprimé de 0,5 mg de DECTANCYL
A **2h** Donner 1 comprimé de 0,5 mg de DECTANCYL

Jour 3 : Relever flacon Ur : CLU
Reposer un autre flacon
A **8h** Cortisol (1 vert gel)
Composé S (1 jaune)
Donner 1 comprimé de 0,5 mg de DECTANCYL
A **14 h** Donner 1 comprimé de 0,5 mg de DECTANCYL
A **20 h** Donner 1 comprimé de 0,5 mg de DECTANCYL
Cortisol (1 vert gel)
A **2h** Donner 1 comprimé de 0,5 mg de DECTANCYL

Jour 4: Relever flacon Ur : CLU
Reposer un autre flacon
A **8h** Cortisol (1 vert gel)
Composé S (1 jaune)
A **20 h** Cortisol (1 vert gel)

Jour 5 : Relever flacon Ur : CLU