



TEST DE FREINAGE FORT AU DEXAMETHAZONE

A JEUN et AU REPOS depuis 0 h

BUT : Suspicion de Cushing

Jour 1 :

Poser flacon urine

A 8 h Cortisol (base) (1 vert gel)
 Composé S (base) (1 jaune)

On donnera le **DECTANCYL** pendant **5 jours** de suite, aux mêmes doses et aux mêmes heures.

Jour 2 :

Relever flacon CLU (Cortisol Libre Urinaire)

Reposer un autre flacon

A 8h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL
A 14 h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL
A 20 h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL
A 2h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL

Jour 3 – J 4 – J 5 – J 6 :

Relever flacon U : CLU

Reposer un autre flacon

A 8h Cortisol (1 vert gel)
 Composé S (1 jaune)
 Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL
A 14 h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL
A 20 h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL
 Cortisol (1 vert gel)
A 2h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL

J 7 :

Relever flacon U : CLU

Reposer un autre flacon

A 8h Cortisol (1 vert gel)
 Composé S (1 jaune)
A 20 h Cortisol (1 vert gel)

J 8 :

Relever flacon U : CLU